

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХЕЕЛЬ

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта Справочник



-Heel

Healthcare designed by nature

ВЫБОР ПО ОСНОВНОМУ ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ПРЕПАРАТУ

| Основные продукты Хеель При следующих симптомах и заболеваниях | Спаскупрель® | Гастрикумель® | Нукс вомика Гоммакорд® | Диархель® | Эхинаcea композиум | Мукоза композиум | Нейрексан®** |
|--|--------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Боль и спазмы в животе | ■ | | | | | | |
| Острый и хронический гастрит | | ■ | | | | | ● |
| Изжога, рефлюксорная диспепсия, возникающая вследствие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) | | ■ | | | | ● | |
| Вздутие/ощущение растяжения живота | | ■ | ● | | | | ● |
| Слабые общие нарушения со стороны желудка (например, диспепсия, боль в животе, отсутствие аппетита, запор) | | ● | ■ | | | | ● |
| Острая диарея | | | | ■ | | | |
| Хроническая диарея | | | | ■ | | ● | ● |
| Бактериальная и другая инфекционная диарея/гастроэнтерит* | | | | ■ | ● | ● | |
| Поддержка иммунной системы после гастроэнтерита | | | | ■ | ■ | ● | |
| Геморрой (кровь в кале и болезненная дефекация) | | | | | ■ | ● | |
| Регенерация слизистой оболочки верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта | | | | | | ■ | |

ВЫБОР ПО ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ

Основной препарат
 Поддерживающий препарат

* При наличии инфекционной диареи с вирусным компонентом следует рассмотреть комбинацию Диархеля и Энгистола
 ** Большинство нарушений со стороны ЖКТ имеют в основе заболевания психологический компонент. Поэтому если у пациента имеется стресс, тревожность, нарушения сна, нервозность, то при лечении упомянутых выше симптомов рекомендуется добавлять Нейрексан.

Препараты и показания

| Препарат | Показания к применению |
|------------------------|---|
| Спаскупрель® | <ul style="list-style-type: none">— Спазматические состояния— Спазмы в животе |
| Гастрikumель® | <ul style="list-style-type: none">— Острый и хронический гастрит— Изжога (диспепсия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ))— Вздутие живота |
| Нукс вомика-Гоммакорд® | <ul style="list-style-type: none">— Функциональные желудочно-кишечные расстройства |
| Диархель® | <ul style="list-style-type: none">— Острая и хроническая диарея— Гастроэнтерит |
| Эхинацея композитум | <ul style="list-style-type: none">— Иммуностимуляция— Облегчение симптомов при острых инфекциях (особенно бактериальных) |
| Мукоза композитум | <ul style="list-style-type: none">— Регуляция и поддержка функций слизистых оболочек, включая желудочно-кишечный тракт |
| Нейрексан® | <ul style="list-style-type: none">— Двигательное беспокойство и нарушения сна |

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Spascupreel®

УСПОКАИВАЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ И МОЧЕПОЛОВЫЕ СПАЗМЫ

- Спазматические состояния
и спазмы в области живота
и мочеполовых путей







Полезные свойства препарата


- Обладает превосходной переносимостью и безопасными характеристиками – при кратковременном и длительном применении
- Обеспечивает быстрое и эффективное облегчение острых спазматических состояний

Spascipreel®

Рекомендации по дозировке

|  Таблетки | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|--|--|--------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) | + 12 | 1 таблетка каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 1 таблетка 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 8 раз в сутки | 1 таблетка 2 раза в сутки |
| Дети 2 - 5 лет |  | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 6 раз в сутки | 1 таблетка 1-2 раза в сутки |
| Дети 0-1 года | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 4 раз в сутки | 1 таблетка 1 раз в сутки |

|  Раствор для инъекций | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|---------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) | + 12 | 1 ампула в сутки | 1 ампула 1-3 раза в неделю |
| Дети 6-11 лет |  | 2/3 ампулы в сутки | 2/3 ампулы 1-3 раза в неделю |
| Дети 2 - 5 лет | | 1/2 ампулы в сутки | 1/2 ампулы 1-3 раза в неделю |


|  Суппозитории | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|------|--|----------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) | + 12 | 1 суппозиторий каждые 2 часа до 6 раз в сутки | 1 суппозиторий 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 суппозиторий каждые 2 часа до 4 раз в сутки | 1 суппозиторий 2 раза в сутки |




Клинические данные

В проспективном когортном исследовании с участием 698 пациентов была продемонстрирована безопасность и эффективность **Спаскупреля®** при лечении спазмов в области живота/кишечника, менструальных спазмов и спазмов мочеполовых путей.¹


Спазмы мочеполовых путей



Менструальные спазмы^A



Спазмы в животе/кишечнике^B



A) Первичная дисменорея, спазмы матки
 B) Плюс спазмы других гладких мышц
 (Результаты проспективного исследования, n = 698)

Ссылки

1) Weiser M., Reuss V., Treating Spasmodic Conditions with Spascupreel, Biological Therapy 2000; 29 (1): 14-17 Graphs adapted from 1)


Spascupreel®

Клинические данные

- 89% пациентов с острыми симптомами сообщили об улучшении своего состояния в первые две недели лечения.¹
- В трех из четырех случаев лечение препаратом **Спаскупрель®** приводило к полному исчезновению симптомов или очевидному улучшению.¹
- Лечение препаратом **Спаскупрель®** было эффективным как при острых, так и при хронических заболеваниях.¹


Spascupreel®

Механизм действия



— Препарат **Спаскупрель®** с его трехсторонним действием влияет на множество причин спазматических состояний желудочно-кишечного тракта.

Механизм действия



- Функциональная активность **Спаскупрель®** восстанавливает функцию кишечника.
- Периферическая активность **Спаскупрель®** расслабляет гладкую мускулатуру.
- Центральная активность **Спаскупрель®** выравнивает состояние центральной нервной системы.

Spascupreel®

Характеристика пациента

ЕКАТЕРИНА, 46 ЛЕТ

Не замужем, детей нет.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Спаскупрель®

Работа: руководитель в пищевой промышленности, часто ездит в деловые поездки за границу.

Медицинский анамнез: депрессивные расстройства. Иногда спазмы в животе.

Нарушения в настоящее время: спазмы в животе

КИРИЛЛ, 49 ЛЕТ

Не женат, детей нет.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Спаскупрель®

Работа: руководитель службы контроля в компании, предоставляющей услуги обеспечения безопасности.

Медицинский анамнез: гастрит, связанный со стрессом, вероятно, вследствие переработки и нездоровых привычек питания, таких как бизнес-ланчи и ужины в ресторане.

Нарушения в настоящее время: очень частые спазмы в желудочно-кишечном тракте.

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Gastricumeel®

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДИСКОМФОРТА ПРИ ГАСТРИТЕ, ИЗЖОГЕ И ВЗДУТИИ ЖИВОТА



Тройное действие против

- острого и хронического гастрита
- изжоги (диспепсии, ГЭРБ)
- вздутия живота

благодаря


- контролю кислотности
- увеличению прочности слизистой оболочки желудка



| Таблетки | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|--|---|--|--------------------------------|
|  Взрослые (и дети 12 лет и старше) | + 12 | 1 таблетка каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 1 таблетка 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 8 раз в сутки | 1 таблетка 2 раза в сутки |
| Дети 2 - 5 лет |  | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 6 раз в сутки | 1 таблетка 1-2 раза в сутки |
| Дети 0-1 года | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 4 раз в сутки | 1 таблетка 1 раз в сутки |

Клиническая эффективность

у пациентов с острым/хроническим гастритом или изжогой¹



Проспективное когортное исследование с участием 617 пациентов (Гастрикумель® = 434, ингибиторы протонной помпы = 183) с острым/хроническим гастритом или изжогой.

Основные критерии для оценки эффективности: фактическая степень тяжести, степень выраженности симптомов и глобальная оценка терапии в конце периода наблюдения (<5 недель, 5–7 недель, >7 недель).

Симптомы включали: кислую отрыжку, ощущение наполненности/давления в области живота, изжогу, тошноту, рвоту, боль в животе, голодная боль, дисфагия.

Дозировка Гастрикумеля® и ингибиторов протонной помпы (в основном, омепразола и пантопразола) назначалась на индивидуальной основе.

Ссылки:

1) Лечение острого/хронического гастрита препаратом Гастрикумель® в сравнении с ингибиторами протонной помпы: проспективное, контролируемое, сравнительное, обсервационное исследование. Неопубликованные данные, Хеель 2017 г. e



НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



Nux vomica- Homaccord®

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛАБЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ

- Функциональные желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, несварение, запор, вздутие живота и диарею



| Капель | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|-----------------------------|
|  <p>Взрослые (и дети 12 лет и старше)</p> | + 12 | 10 капель каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 10 капель 3 раза в сутки |
| <p>Дети 6-11 лет</p> | | 7 капель каждые 1/2-1 час до 12 раз в сутки | 7 капель 3 раза в сутки |
| <p>Дети 2-5 лет</p> | | 5 капель каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 5 капель 3 раза в сутки |
| <p>Дети 0-1 года</p> |  | 3 капли каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 3 капли 3 раза в сутки |

| Раствор для инъекций: | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|---------------------------------|
|  <p>Взрослые (и дети 12 лет и старше)</p> | + 12 | 1 ампула в сутки | 1 ампула 1-3 раза в неделю |
| <p>Дети 6-11 лет</p> |  | 2/3 ампулы в сутки | 2/3 ампулы 1-3 раза в неделю |
| <p>Дети 2-5 лет</p> | | 1/2 ампулы в сутки | 1/2 ампулы 1-3 раза в неделю |

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Diarrheel®

НАТУРАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ

- Острая и хроническая диарея
- Гастроэнтерит



Таблетки

Взрослые
(и дети 12 лет и старше)

+ 12

Дети
6-11 лет



Дети
2 - 5 лет

Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка

1 таблетка каждые 1/2-1 час,
до 12 раз в сутки

1 таблетка каждые 1-2 часа,
до 8 раз в сутки

1 таблетка каждые 1-2 часа,
до 6 раз в сутки

Стандартная дозировка

1 таблетка
3 раза в сутки

1 таблетка
2 раза в сутки



1 таблетка
1-2 раза в сутки



Echinacea compositum

УСИЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ ИНФЕКЦИИ

- Иммуностимуляция
- Облегчение симптомов при острых инфекциях (особенно бактериальных)



|  Таблетки | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|--------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) + 12 | | 1 таблетка каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 1 таблетка 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 8 раз в сутки | 1 таблетка 2 раза в сутки |
| Дети 2-5 лет |  | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 6 раз в сутки | 1 таблетка 1-2 раза в сутки |
| Дети 0-1 года | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 4 раз в сутки | 1 таблетка 1 раз в сутки |

|  Раствор для инъекций | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|---------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) + 12 | | 1 ампула в сутки | 1 ампула 1-3 раза в неделю |
| Дети 6-11 лет | | 2/3 ампулы в сутки | 2/3 ампулы 1-3 раза в неделю |
| Дети 2-5 лет |  | 1/2 ампулы в сутки | 1/2 ампулы 1-3 раза в неделю |




НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА




Mucosa compositum

для здоровой слизистой оболочки ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

- Регуляция и поддержка функций слизистых оболочек, включая желудочно-кишечный тракт



|  Таблетки | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|--------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) + 12 | | 1 таблетка каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 1 таблетка 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 8 раз в сутки | 1 таблетка 2 раза в сутки |
| Дети 2-5 лет |  | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 6 раз в сутки | 1 таблетка 1-2 раза в сутки |
| Дети 0-1 года |  | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 4 раз в сутки | 1 таблетка 1 раз в сутки |

|  Раствор для инъекций | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|---|--|---------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше) + 12 | | 1 ампула в сутки | 1 ампула 1-3 раза в неделю |
| Дети 6-11 лет |  | 2/3 ампулы в сутки | 2/3 ампулы 1-3 раза в неделю |
| Дети 2-5 лет |  | 1/2 ампулы в сутки | 1/2 ампулы 1-3 раза в неделю |




НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Neurexan®

НАТУРАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА СТРЕСС, НЕРВозНОСТЬ И НАРУШЕНИЯ СНА

- Расслабляющее действие в острых стрессовых ситуациях
- Быстрое наступление действия и отсутствие привыкания
- Безопасность и хорошая переносимость
- Отсутствие седативных эффектов
- Не приводит к утомляемости
- Можно принимать в любом месте и в любое время



|  Таблетки | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|--|--|--------------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше)  | | 1 таблетка каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 1 таблетка 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 8 раз в сутки | 1 таблетка 2 раза в сутки |
| Дети 2-5 лет  | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 6 раз в сутки | 1 таблетка 1-2 раза в сутки |
| Дети 0-1 года | | 1 таблетка каждые 1-2 часа, до 4 раз в сутки | 1 таблетка 1 раз в сутки |

|  Капли | | Дозировка при остром состоянии или начальная дозировка | Стандартная дозировка |
|---|--|--|-----------------------------|
| Взрослые (и дети 12 лет и старше)  | | 10 капель каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 10 капель 3 раза в сутки |
| Дети 6-11 лет | | 7 капель каждые 1/2-1 час до 12 раз в сутки | 7 капель 3 раза в сутки |
| Дети 2-5 лет  | | 5 капель каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 5 капель 3 раза в сутки |
| Дети 0-1 года | | 3 капли каждые 1/2-1 час, до 12 раз в сутки | 3 капли 3 раза в сутки |

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Информация о продуктах в алфавитном порядке

Diarrheel®

Diarrheel Summary of Product Characteristics

Tablets

Compositions: Tablets: 1 tablet contains: Active ingredients: Acidum arsenicosum D8 30 mg, Argentum nitricum D8 30 mg, Citrullus colocynthis D6 30 mg, Colchicum autumnale D6 30 mg, Hydrargyrum bichloratum D8 30 mg, Podophyllum peltatum D6 30 mg, Veratrum album D4 30 mg. Excipients: Lactose monohydrate 90.0 mg, Magnesium stearate 1.5 mg. Contains lactose.

Indications: Tablets: Gastroenteritis, acute and chronic diarrhea.

Contraindications: Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: Tablets: Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product.

Side effects: Tablets: Like all medicinal products, homeopathic medicines can cause side effects in isolated cases, such as transient allergic reactions. The frequency of these effects is not known.

Interactions with other medication: Tablets: No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: Tablets: For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicament are not known to be toxic during pregnancy and lactation, and adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: Tablets: No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilution.

Dosage: Tablets: Standard dosage: Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 3x daily. Pediatric: 2–5 yrs.: 1 tablet 1–2x daily.

6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 8x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. For children it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals.

Overdose: Tablets: No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: Tablets (51833): Packs containing 50 and 250 tablets.

Общую характеристику продукта (ОХП)
необходимо адаптировать соответствующим образом
для каждой страны
SMPC needs to be adapted locally

Echinacea compositum

Echinacea compositum Summary of Product Characteristics

Tablets • Injection solution

Compositions: **Tablets:** 1 tablet contains: Active ingredients: Bryonia D4 0.3 mg, Echinacea D2 0.9 mg, Lachesis D10 0.3 mg, Matricaria recutita D6 0.3 mg, Phytolacca americana D4 0.3 mg, Rhus toxicodendron D4 0.3 mg, Thuja occidentalis D4 0.3 mg, Hepar sulfuris D8 0.3 mg. Excipients: Lactose monohydrate 299.7 mg, Magnesium stearate 1.5 mg. **Injection solution:** 1 ampoule = 2.2 g contains: Active ingredients: Acidum arsenicosum D8 22 mg, Aconitum napellus D3 22 mg, Argentum nitricum D8 22 mg, Arnica montana D4 22 mg, Baptisia tinctoria D4 22 mg, Bryonia D6 22 mg, Cortisonum aceticum D13 22 mg, Echinacea D5 22 mg, Eupatorium perfoliatum D6 22 mg, Euphorbium D6 22 mg, Gelsemium sempervirens D6 22 mg, Hepar sulfuris D10 22 mg, Hydrargyrum bichloratum D8 22 mg, Lachesis D10 22 mg, Phosphorus D8 22 mg, Phytolacca americana D6 22 mg, Pulsatilla pratensis D8 22 mg, Rhus toxicodendron D4 22 mg, Sanguinaria canadensis D5 22 mg, Sulfur D8 22 mg, Thuja occidentalis D8 22 mg, Zincum metallicum D10 22 mg. Excipients: Sodium chloride 18.5–19.7 mg, Water for injections 1716 mg.

Indications: **Tablets, injection solution:** Stimulation of the body's intrinsic defense system in cases of inflammations and infections of all tissues and organs.

Contraindications: **Tablets, injection solution:** Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: **Tablets:** Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product. **Injection solution:** None.

Side effects: **Tablets, injection solution:** None have been reported.

Interactions with other medication: **Tablets, injection solution:** No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: **Tablets, injection solution:** For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicament are not known to be toxic during pregnancy and lactation. No adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: **Tablets, injection solution:** No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: **Tablets:** **Standard Dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 1x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet 1x daily. 2–5 yrs.: 1 tablet 1–2x daily. 6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or Initial Dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 4x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. In children, it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals. **Injection solution:** Standard dosage: Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule 1 to 3x weekly. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule 1 to 2x weekly. 6–11 yrs.: ⅓ of an ampoule 1 to 3x weekly. **Acute or Initial Dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: ⅓ of an ampoule daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Echinacea comp., Solution for injection may be administered by the s.c., i.d., i.m. or i.v. route.

Overdose: **Tablets, injection solution:** No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: **Tablets (9820):** Packs containing 50 and 250 tablets. **Injection solution (52729):** Packs containing 5, 10, 50 and 100 ampoules of 2.2 ml.

Общую характеристику продукта (ОХП) необходимо адаптировать соответствующим образом для каждой страны. SMPC needs to be adapted locally

Gastricumeel®

Gastricumeel® Summary of Product Characteristics

Tablets

Compositions: Tablets: 1 tablet contains: Active ingredients: Acidum arsenicosum D6 30.0 mg, Argentum nitricum D6 30.0 mg, Carbo vegetabilis D6 60.0 mg, Pulsatilla pratensis D4 60.0 mg, Stibium sulfuratatum nigrum D6 60.0 mg, Strychnos nux-vomica D4 60.0 mg. Excipients: Magnesium stearate 1.5 mg. Contains lactose.

Indications: Tablets: Acute and chronic gastritis, acid reflux, heartburn and abdominal bloating.

Contraindications: Tablets: Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: Tablets: Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product.

Side effects: Tablets: Like all medicinal products, homeopathic medicines can cause side effects in isolated cases, such as transient allergic reactions.

Interactions with other medication: Tablets: No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: Tablets: For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicament are not known to be toxic during pregnancy and lactation. No adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: Tablets: No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: Tablets: Standard dosage: Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet 1x daily. 2–5 yrs.: 1 tablet 1–2x daily. 6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 4x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 8x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. For children it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals.

Overdose: Tablets: No cases of overdose have been reported, as none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: Tablets (9673): Packs containing 50 and 150 tablets.

Общую характеристику продукта (ОХП)
необходимо адаптировать соответствующим образом
для каждой страны
SmPC needs to be adapted locally

Mucosa compositum

Mucosa compositum Summary of Product Characteristics

Tablets • Injection solution

Compositions: Tablets: 1 tablet contains: Active ingredients: Argentum nitricum D6 1.0 mg, Atropa bella-donna D10 1.0 mg, Ceanothus americanus D4 1.0 mg, Hydrastis canadensis D6 1.0 mg, Kalium bichromicum D8 1.0 mg, Kreosotum D12 1.0 mg, Lachesis D10 1.0 mg, Mandragora e radice siccata D10 1.0 mg, Marsdenia cundurango D6 1.0 mg, Momordica balsamina D6 1.0 mg, Mucosa coli suis D8 1.0 mg, Mucosa ductus choledochi suis D8 1.0 mg, Mucosa duodeni suis D8 1.0 mg, Mucosa ilei suis D8 1.0 mg, Mucosa jejuni suis D8 1.0 mg, Mucosa nasalis suis D8 1.0 mg, Mucosa oculi suis D8 1.0 mg, Mucosa oesophagi suis D8 1.0 mg, Mucosa oris suis D8 1.0 mg, Mucosa pulmonis suis D8 1.0 mg, Mucosa pylori suis D8 1.0 mg, Mucosa recti suis D8 1.0 mg, Mucosa vesicae felleae suis D8 1.0 mg, Mucosa vesicae urinariae suis D8 1.0 mg, Oxalis acetosella D6 1.0 mg, Pankreas suis D10 1.0 mg, Phosphorus D8 1.0 mg, Psychotria ipecacuanha D8 1.0 mg, Pulsatilla pratensis D6 1.0 mg, Semecarpus anacardium D6 1.0 mg, Strychnos nux-vomica D13 1.0 mg, Sulfur D8 1.0 mg, Ventriculus suis D8 1.0 mg, Veratrum album D6 1.0 mg. Excipients: Lactose monohydrate 300 mg, Magnesium stearate 1.5 mg. Contains lactose. **Injection solution:** 1 ampoule of 2.2 ml (=2.2 g) contains: Active ingredients: Argentum nitricum D6 22.0 mg, Atropa bella-donna D10 22.0 mg, Ceanothus americanus D4 22.0 mg, Hydrastis canadensis D4 22.0 mg, Kalium bichromicum D8 22.0 mg, Kreosotum D10 22.0 mg, Lachesis D10 22.0 mg, Mandragora e radice siccata D10 22.0 mg, Marsdenia cundurango D6 22.0 mg, Momordica balsamina D6 22.0 mg, Mucosa coli suis D8 22.0 mg, Mucosa ductus choledochi suis D8 22.0 mg, Mucosa duodeni suis D8 22.0 mg, Mucosa ilei suis D8 22.0 mg, Mucosa jejuni suis D8 22.0 mg, Mucosa nasalis suis D8 22.0 mg, Mucosa oculi suis D8 22.0 mg, Mucosa oesophagi suis D8 22.0 mg, Mucosa oris suis D8 22.0 mg, Mucosa pulmonis suis D8 22.0 mg, Mucosa pylori suis D8 22.0 mg, Mucosa recti suis D8 22.0 mg, Mucosa vesicae felleae suis D8 22.0 mg, Mucosa vesicae urinariae suis D8 22.0 mg, Oxalis acetosella D6 22.0 mg, Pankreas suis D10 22.0 mg, Phosphorus D8 22.0 mg, Psychotria ipecacuanha D8 22.0 mg, Pulsatilla pratensis D6 22.0 mg, Semecarpus anacardium D6 22.0 mg, Strychnos nux-vomica D13 22.0 mg, Sulfur D8 22.0 mg, Ventriculus suis D8 22.0 mg, Veratrum album D6 22.0 mg, Natrium diethyloxalacetatum D8 22.0 mg. Excipients: Sodium chloride 19.1 mg, water for injection 1430 mg.

Indications: Tablets, injection solution: Disorders of mucous membranes (gastrointestinal, respiratory and genitourinary system and the eye).

Contraindications: Tablets, injection solution: Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: Tablets: Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product. **Injection solution:** None.

Side effects: Tablets: Like all medicinal products, this homeopathic medicinal product can cause side effects, although not everybody gets them. **Injection solution:** None has been reported.

Interactions with other medicinal products and other forms of therapy: Tablets, injection solution: No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: Tablets, injection solution: For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicament are not known to be toxic during pregnancy and lactation. No adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: Tablets, injection solution: No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: Tablets: Standard dosage: Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet 1x daily. 2–5 yrs.: 1 tablet 1–2x daily. 6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 4x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 8x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. For children it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals. **Injection solution: Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule 1 to 3x weekly. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule 1 to 3x weekly. 6–11 yrs.: ⅓ of an ampoule 1 to 3x weekly. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: ⅓ of an ampoule daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Mucosa comp.-Heel, Solution for injection may be administered by the s.c., i.d., i.m. or i.v. route.

Overdose: Tablets, injection solution: No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: Tablets (52268): Packs containing 50 and 250 tablets. **Injection solution (52546):** Packs containing 5, 10, 50 and 100 ampoules of 2.2 ml each.

Общую характеристику продукта (ОХП)
необходимо адаптировать соответствующим образом
для каждой страны
SMPC needs to be adapted locally

Neurexan® Summary of Product Characteristics

Tablets • Oral drops

Compositions: **Tablets:** 1 tablet contains: Active ingredients: Avena sativa D2 0.6 mg, Coffea arabica D12 0.6 mg, Passiflora incarnata D2 0.6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0.6 mg. Excipients: Lactose monohydrate 300 mg, Magnesium stearate 1.5 mg. Contains lactose. **Oral drops:** 100 g contain: Active ingredients: Avena sativa D2 0.06 g, Coffea arabica D12 0.06 g, Passiflora incarnata D2 0.06 g, Zincum isovalerianicum D4 0.06 g. Excipients: Ethanol 96% (V/V) 31.34 g; water, purified 68.42 g.

Indications: **Tablets, oral drops:** Nervous restlessness and sleep disturbances.

Contraindications: **Tablets, oral drops:** Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: **Tablets:** Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product. **Oral drops:** This medicinal product contains 36 vol.-% ethanol (alcohol).

Side effects: **Tablets:** Allergic (hypersensitivity) skin reactions may occur in very rare cases (i.e. affects less than 1 in 10,000 users). Due to the homeopathic nature of Neurexan tablets a temporary worsening in symptoms (initial aggravation) is possible but harmless. **Oral drops:** Due to the homeopathic nature of Neurexan drops a temporary worsening in symptoms (initial aggravation) is possible but harmless.

Interactions with other medication: **Tablets, oral drops:** No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: **Tablets, oral drops:** For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicament are not known to be toxic during pregnancy and lactation. Adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: **Tablets, oral drops:** No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: **Tablets:** **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet 1x daily. 2–5 yrs.: 1 tablet 1–2x daily. 6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 4x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs., up to 6x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. For children, it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals. **Oral drops:** **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 10 drops 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 3 drops 3x daily. 2–5 yrs.: 5 drops 3x daily. 6–11 yrs.: 7 drops 3x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 10 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 3 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 5 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 7 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** This medicine should be taken away from meals. For children, add drops to a small amount of water.

Overdose: **Tablets, oral drops:** No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: **Tablets (9519):** Packs containing 50 and 250 tablets. **Oral drops (9880):** Packs containing 30 ml and 100 ml.

Общую характеристику продукта (ОХП) необходимо адаптировать соответствующим образом для каждой страны. SMPC needs to be adapted locally

Nux vomica- Homaccord®

Nux vomica-Homaccord® Summary of Product Characteristics

Oral drops • Injection solution

Compositions: *Oral drops:* 100 g contain: Active ingredients; Bryonia D2 0.2 g, Bryonia D6 0.2 g, Bryonia D10 0.2 g, Bryonia D15 0.2 g, Bryonia D30 0.2 g, Bryonia D200 0.2 g, Bryonia D1000 0.2 g, Citrullus colocynthis D3 0.3 g, Citrullus colocynthis D10 0.3 g, Citrullus colocynthis D30 0.3 g, Citrullus colocynthis D200 0.3 g, Lycopodium clavatum D3 0.3 g, Lycopodium clavatum D10 0.3 g, Lycopodium clavatum D30 0.3 g, Lycopodium clavatum D200 0.3 g, Lycopodium clavatum D1000 0.3 g, Strychnos nux-vomica D2 0.2 g, Strychnos nux-vomica D10 0.2 g, Strychnos nux-vomica D15 0.2 g, Strychnos nux-vomica D30 0.2 g, Strychnos nux-vomica D200 0.2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0.2 g. Excipients: Ethanol (96 per cent) 27.8 g; water, purified 66.9 g. *Injection solution:* 1 ampoule of 1.1 ml (=1.1g) contains: Active ingredients: Bryonia D4 2.2 mg, Bryonia D6 2.2 mg, Bryonia D10 2.2 mg, Bryonia D15 2.2 mg, Bryonia D30 2.2 mg, Bryonia D200 2.2 mg, Bryonia D1000 2.2 mg, Citrullus colocynthis D5 3.3 mg, Citrullus colocynthis D10 3.3 mg, Citrullus colocynthis D30 3.3 mg, Citrullus colocynthis D200 3.3 mg, Lycopodium clavatum D5 3.3 mg, Lycopodium clavatum D10 3.3 mg, Lycopodium clavatum D30 3.3 mg, Lycopodium clavatum D200 3.3 mg, Lycopodium clavatum D1000 3.3 mg, Strychnos nux-vomica D4 2.2 mg, Strychnos nux-vomica D10 2.2 mg, Strychnos nux-vomica D15 2.2 mg, Strychnos nux-vomica D30 2.2 mg, Strychnos nux-vomica D200 2.2 mg, Strychnos nux-vomica D1000 2.2 mg. Excipients: Sodium chloride 10.2 mg, water for injections 1041.7 mg.

Indications: *Oral drops, injection solution:* Functional disturbances of the liver and gastrointestinal system, including nausea, indigestion, constipation, abdominal bloating and diarrhea; symptoms associated with consumption of alcohol, coffee or nicotine. Support of detoxification and elimination processes of the liver and gastrointestinal system.

Contraindications: *Oral drops, injection solution:* Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: *Oral drops:* This medicinal product contains 25.01.9% ethanol (alcohol). *Injection solution:* None.

Side effects: *Oral drops, injection solution:* Like all medicinal products, homeopathic medicines may cause side effects. In isolated cases transient skin reactions (eg. rash, pruritus) have been reported. The frequency of these reactions is not known.

Interactions with other medication: *Oral drops, injection solution:* No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: *Oral drops, injection solution:* For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicinal product are not known to be toxic during pregnancy and lactation. No adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: *Oral drops, injection solution:* No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: *Oral drops:* **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 10 drops 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 3 drops 3x daily. 2–5 yrs.: 5 drops 3x daily. 6–11 yrs.: 7 drops 3x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 10 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 3 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 5 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 7 drops every ½ to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** This medicine should be taken away from meals. For children, add drops to a small amount of water. *Injection solution:* **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule 1 to 3x weekly. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule 1 to 3x weekly. 6–11 yrs.: 2/3 of an ampoule 1 to 3x weekly.

Acute or initial dosage: Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 2–5 yrs.: ½ ampoule daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 2/3 of an ampoule daily, and then continue with standard dosage.

Method of administration: Strychnos nux-vomica-Homaccord, Solution for injection may be administered by the s.c., i.d., i.m. or i.v. route.

Overdose: *Oral drops, injection solution:* No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: *Oral drops (9786):* Packs containing 30 ml and 100 ml. *Injection solution (8587):* Packs containing 5, 10, 50 and 100 ampoules of 1.1 ml each.

Общую характеристику продукта (ОХП)
необходимо адаптировать соответствующим образом
для каждой страны
SMPC needs to be adapted locally

Spascupreel®

Spascupreel® Summary of Product Characteristics

Tablets • Injection solution • Suppositories

Compositions: **Tablets:** 1 tablet contains: Active ingredients: Aconitum napellus D6 60 mg, Amanita muscaria D4 15 mg, Ammonium bromatum Trit. D4 30 mg, Atropinum sulfuricum D6 30 mg, Citrullus colocynthis D4 30 mg, Cuprum sulfuricum D6 15 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Magnesium phosphoricum D6 30 mg, Matricaria recutita D3 15 mg, Passiflora incarnata D2 15 mg, Veratrum album D6 30 mg; Excipients: Magnesium stearate 1.5 mg; contains lactose. **Injection solution:** 1 ampoule of 1,1 ml (=1,1 g) contains: Active ingredients: Aconitum napellus D6 2.20 mg, Amanita muscaria D4 0.55 mg, Ammonium bromatum D4 1.10 mg, Atropinum sulfuricum D6 1.10 mg, Citrullus colocynthis D4 1.10 mg, Cuprum sulfuricum D6 0.55 mg, Gelsemium sempervirens D6 1.10 mg, Magnesium phosphoricum D6 1.10 mg, Matricaria recutita D3 0.55 mg, Passiflora incarnata D2 0.55 mg, Veratrum album D6 1.10 mg; Excipients: Sodium chloride 10.4 mg, water for injections 1089.0 mg. **Suppositories:** 1 suppository = 2.0 g containing: Active ingredients: Aconitum napellus D5 2.20 mg, Amanita muscaria D3 0.55 mg, Ammonium bromatum D3 1.10 mg, Atropinum sulfuricum D5 1.10 mg, Citrullus colocynthis D3 1.10 mg, Cuprum sulfuricum D5 0.55 mg, Gelsemium sempervirens D5 1.10 mg, Magnesium phosphoricum D6 1.10 mg, Matricaria recutita D2 0.55 mg, Passiflora incarnata D1 0.55 mg, Veratrum album D5 1.10 mg; Excipients: Hard fat 1989.0 mg.

Indications: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** Spasms of the smooth musculature of the gastrointestinal and the urogenital tract.

Contraindications: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** Known allergy (hypersensitivity) to one or more of the ingredients.

Special warnings and special precautions for use: **Tablets:** Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product. **Injection solution, Suppositories:** None.

Side effects: **Tablets:** Like all medicinal products, this homeopathic medicinal product can cause side effects, although not everybody gets them. **Injection solution, Suppositories:** Like all medicinal products, homeopathic medicinal products can cause side effects in isolated cases, such as transient allergic reactions. The frequency of these effects is not known.

Interactions with other medication: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** No interactions have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Pregnancy and lactation: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** For this product no clinical data on pregnancy and lactation are available. Homeopathic dilutions of the substances present in this medicinal product are not known to be toxic during pregnancy and lactation. No adverse effects have so far been reported.

Effects on ability to drive and use machines: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** No effects on the ability to drive and use machines have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Dosage: **Tablets:** **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet 3x daily. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet 1x daily. 2–5 yrs.: 1 tablet 1x daily. 6–11 yrs.: 1 tablet 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 tablet every 1/2 to 1 hr., up to 12x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: Below 2 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs. up to 4x daily, and then continue with standard dosage. 2–5 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs. up to 6x daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 1 tablet every 1 to 2 hrs. up to 8x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Preferably allow the tablet to dissolve in the mouth, and then swallow. For children it is possible to crush the tablet and add to a small amount of water. This medicine should be taken away from meals. **Injection solution:** **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule 1 to 3x weekly. Pediatric: 2–5 yrs.: 1/2 ampoule 1 to 3x weekly. 6–11 yrs.: 2/3 of an ampoule 1 to 3x weekly. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 ampoule daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 2–5 yrs.: 1/2 ampoule daily, and then continue with standard dosage. 6–11 yrs.: 2/3 of an ampoule daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Spascupreel, Solution for injection may be administered by the s.c., i.d., i.m. or i.v. route. **Suppositories:** **Standard dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 suppository 3x daily. Pediatric: 6–11 yrs.: 1 suppository 2x daily. **Acute or initial dosage:** Adults (and children 12 yrs. and older): 1 suppository every 2 hrs. up to 6x daily, and then continue with standard dosage. Pediatric: 6–11 yrs.: 1 suppository every 2 hrs. up to 4x daily, and then continue with standard dosage. **Method of administration:** Insert suppository into the rectum.


Overdose: **Tablets, Injection solution, Suppositories:** No cases of overdose have been reported, and none are expected due to the homeopathic dilutions.

Package sizes: **Tablets (9749):** Packs containing 50 and 250 tablets. **Injection solution (8558):** Packs containing 5, 10, 50 and 100 ampoules of 1.1 ml each. **Suppositories (9573):** Packs containing 12 and 60 suppositories of 2.0 g

Общую характеристику продукта (ОХП)
необходимо адаптировать соответствующим образом
для каждой страны
SMPC needs to be adapted locally

Обзор

1. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
2. Кашель и простуда
3. Скелетно-мышечные заболевания
4. Стресс и сон
5. Аллергии
6. Женское здоровье



В данной папке содержится полезная информация о здоровье, основанная на научных данных и предназначенная только для образовательных целей. Информация и/или рекомендации по лечению не являются конкретными рекомендациями для каждого отдельного человека и не должны использоваться в качестве замены или альтернативы профессиональным рекомендациям по лечению, предлагаемым врачом или другим квалифицированным медицинским работником. Компания «Хеель» не несет ответственности за любые потери или ущерб, вызванные или предположительно вызванные напрямую или косвенно вследствие использования представленной здесь информации.

Следует помнить, что названия лекарственных препаратов, показания и/или рецептуры в разных странах могут отличаться, и в каждой стране в листке-вкладыше к упаковке может быть представлена специфичная для страны информация. Поэтому вы должны убедиться, что содержание любого используемого вами материала соответствует местному законодательству и другим регуляторным и/или медицинским требованиям.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Straße 2–4
76532 Baden-Baden
Germany (Германия)

Тел. +49 (0) 722 15 01 00
info@heel.com
www.heel.com

-Heel
Healthcare designed by nature